

Drittes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz in Prag, Pflastergasse Nr. 1056 zum Tausch oder Kauf*) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingungen vorrätig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegenseudungen verhältnißmäßige Geldvorschuße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 fr. C. M.

Gentiana Amarella. L. (Mörkenstein.) — bavarica. L. (Sommerauer.) — campestris. L. (Mann.) — ciliata. L. (Praesens.) — cruciata. L. (Hinterhuber.) — glacialis. Villars. (Hinterhuber.) — pannonica. L. (Hölzel.) — *Pneumonanthe*. L. (Mann.) — verna. L. (Mörkenstein.) — *Geoglossum* glabrum. (Reichenbach.) — *Georgina* variabilis. W. (Nenning.) — *Geranium* ibericum. Cav. (Braun.) — replicatum. Hort. Weim. (Braun.) — bohemicum. L. (Kostelecky.) — columbinum. L. (Weihe.) — divaricatum. Ehrh. (Kostelecky.) — lucidum. L. (Gerhard.) — molle. L. (Kostelecky.) — palustre. L. (Kostelecky.) — pusillum. L. (Opiz.) — Robertianum. L. (Eisenstein.) — rotundifolium. L. (Weihe.) — sanguineum. L. (Kostelecky.) — anemonaefolium. Herit. (Speckmoser.) — carolinianum. L. (Kostelecky.) — *Geum* rivale. L. (Prochaska.) — urbanum. L. (Moschner.) — *Glaucium* corniculatum. P. (Carl.) — *Glaux* maritima. L. (Streinz.) — *Glechoma* hederacea. L. (Eisenstein.) — *Globularia* cordifolia. L. (Sommerauer.) — nudicaulis. L. (Sommerauer.) — vulgaris. L. (Fürrrohr.) — *Glycirrhiza* echinata. L. (Maly.) — *Gnaphalium* expansum. Thunberg. (Günther.) — fuscatum. Pers. (Sommerauer.) — supinum pusillum. Haenke. (Opiz.) — arenarium. L. (Mörkenstein.) — dioicum. L. (Kostelecky.) — *Leontopodium*. L. (Praesens.) — lutealbum. L. (Sykora.) — margaritaceum. L. (Maly.) — sylvaticum. Aut. (Kostelecky.) — uliginosum. L. (Kostelecky.) — *Gnidia* simplex L. (Walter.) — *Gomphrena* globosa. L. (Hentschel.) — *Gratiola* officinalis. L. (Buckhardt.) — *Grimmia* controversa. (Gerhard.) — cribrosa. (Kostelecky.) — cirrata. (Opiz.) — filiformis.

*) Die Centurie à 5 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

(Opiz.) — *gracilis*. (Opiz.) — *apocarpa*. (Opiz.) — *striata*.
 (Opiz.) — *Gymnostomum truncatum majus*. W. et Mohr.
 (Opiz.) — *Hedwigia Schrank*. (Kostelecky.) — *ovatum*. Hedw.
 (Opiz.) — *fasciculare*. Hedw. (Opiz.) — *microstomum*. Hedw.
 (Sykora.) — *aquaticum*. (Hinterhuber.) — *rupestre*. (Braun.)
 — *truncatum*. (Führrohr.) — *Gymnostyles anthemifolia*.
 Juss. (Kostelecky.) — *Gypsophila paniculata*. L. (Kostelec-
 ky.) — *repens*. L. (Hinterhuber.) — *serotina*. Willd. (Mosch-
 ner.) — *dubia*. Willd. (Braun.) — *Gyrophora glabra*. Flör-
 ke. (Benesch.) — *pustulata*. Ach. (Opiz.) — *Hedera helix*.
 L. (Hackl.) — *Hedypnois cretica*. (Walter.) — *Hedysarum*
coronarium. L. (Hentschel.) — *obscurum*. L. (Reinegger.) —
Onobrychis. L. (Eisenstein.) — *Helenium quadridentatum*.
 L. (Hentschel.) — *Helianthemum marifolium*. (Mann.) —
mutabile. (Weihe.) — *pulverulentum*. (Ziz.) — *oelandicum*.
 (Eisenstein.) — *Helianthus exaltatus*. Zeyher. (Günther.) —
trachelifolius. Miller. (Mann.) — *giganteus*. L. (Petters.) —
decapetalus. L. (Mann.) — *macrophyllus*. W. (Günther.) —
missuricus. Otto. (Günther.) — *pubescens*. Vahl. (Günther.)
 — *Helichrysum chrysanthum*. Pers. (Hentschel.) — *Heliopsis*
helianthoides. (Maly.) — *Heliotropium peruvianum*. L. (Ma-
 ly.) — *Helleborus niger*. L. (Hinterhuber.) — *viridis*. L.
 (Hinterhuber.) — *Helmisporium velutinum*. Link. (Gerhard.)
 — *Hemerocalis fulva*. L. (Mann.) — *Hemimeris urticaefo-*
lia. W. (Petters.) — *Heracleum austriacum*. L. (Sommerauer.)
 — *Sphondilium*. L. (Mann.) — *Hesperis inodora*. L. (Adamow-
 sky.) — *Hermannia alnifolia*. L. (Masner.) — *lavandulaefo-*
lia. L. (Walter.) — *Herniaria glabra*. L. (Kostelecky.) — *Hes-*
peris maritima. L. (Kostelecky.) — *Heterospermum pinna-*
tum. Cav. (Kostelecky.) — *Heuchera americana*. L. (Mann.)
 — *Hibiscus trionum*. L. (Kostelecky.) — *syriacus*. L. (Pet-
 ters.) — *Hieracium Bauhini*. Schultes. (Burckhardt.) — *can-*
dicans. Tausch. (Mann.) — *globuliferum*. Tausch. (Mann.)
 — *pratense*. Tausch. (Mann.) — *setigerum*. Tausch. (Mann.)
 — *vulgare*. Tausch. (Mann.) — *alpestre*. Jacquin. (Führ-
 rohr.) — *aureum*. Villars. (Hölzel.) — *chondrilloides*. L.
 (Sommerauer.) — *collinum*. Bernh. (Grabowsky) — *cymo-*
sum. L. (Mann.) — *dubium*. L. (Kostelecky.) — *echioides*. W.
 et K. (Benesch.) — *glauescens*. Besser. (Kostelecky) — *muro-*

rum. L. (Kosteletzky.) — paludosum. L. (Kosteletzky.) — Pilosella. L. (Eisenstein.) — praemorsum. L. (Kosteletzky.) — sylvaticum. Gouan. (Kosteletzky.) — villosum. L. (Sommerauer.) — glaucum. Allion. (Weihe.) — hyoseridifolium. Villars. (Sommerauer.) — speciosum. (Günther.) — calcareum. Hornem. (Weihe.) — *Hippocrepis comosa*. L. (Hölzel.) — multisiliqua. L. (Kosteletzky.) — *Hippophaë rhamnoides*. L. (Girtaner-Maly.) — *Hippuris vulgaris*. L. (Opiz.) — *Holcus avenaceus*. Scop. (Moschner.) — lanatus. L. (Moschner.) — *Holosteum umbellatum*. L. (Opiz.) — *Hordeum cöleste*. Viborg (Kosteletzky.) — distichum. L. (Mann) — murinum. L. (Kosteletzky.) — pratense. Huds. (Gerhard.) — vulgare. L. (Kosteletzky.) — *Hottonia palustris*. L. (Kosteletzky.) — *Humulus lupulus*. L. (Kosteletzky.) — *Hyacinthus lividus*. P. (Braun.) — muscari. L. (Burckhardt.) — racemosus. L. (Jungbauer.) — orientalis. L. (Mann.) — *Hydnum auriscalpium*. (Gerhard.) — *Hydrangea arborescens*. L. (Mann.) — *Hydrophyllum virginicum*. L. (Mann.) — *Hyosciamus albus*. L. (Kosteletzky.) — niger. L. (Petters.) — *Hyoseris fétida*. L. (Hinterhuber.) — *Hypericum hirsutum*. L. (Opiz.) — humifusum. L. (Maly.) — montanum. L. (Kosteletzky.) — perforatum. L. (Mann.) — *Hypochaeris radicata*. L. fil. (Kosteletzky.) — *Hypericum Androsaemum*. L. (Speckmoser.) — elodes. L. (Weihe.) — hircinum. L. (Nenning.) — pulchrum. L. (Thon.) — *Kohlium*. Sprengl. (Neumann.) — *Hypnum aciphyllum pedunculis solitariis* (Kosteletzky) — cordifolium. (Fürnröhr.) — uncinatum. (Opiz.) — murale. (Hornung.) — sylvaticum. (Opiz.) — abietinum. (Kosteletzky.) — ligulatum. (Benesch.) — filicinum. (Sehlmeyer.) — crista castrensis (Uechtriz.) — cupressiforme (Opiz.) — longirostre. (Fürnröhr.) — argenteum. (Opiz.) — lutescens. (Opiz.) — rugosum. W. M. (Opiz.) — cuspidatum. (Opiz.) — saxicola. Voit. (Opiz.) — splendens. (Ramisch.) — alopecurum. (Sykora.) — commutatum. (Sykora.) — curvatum. (Jungbauer.) — squarrosum. (Ramisch.) — aciphyllum. (Opiz.) — aduncum. (Gerhard.) — carneum. (Opiz.) — capillare. (Opiz.) — caespitium. (Kosteletzky.) — hornum. (Sehlmeyer.) — intricatum. (Gerhard.) — julaceum (Ramisch.) — loreum. (Opiz.) — marginatum. (Benesch.) — *Molluscum* (Sehlmeyer.) — nitens.

(Fürrrohr.) — praelongum. (Sehlmeyer.) — punctatum. (Ramisch.) — riparioides (Gerhard.) — rutabulum (Fürrrohr.) — rugulosum. (Ramisch.) — serpens. (Sehlmeyer.) — tamariscinum. (Ramisch.) — triquetrum. (Kostelecky.) — velutinum. (Kostelecky.) — serratum. (Bartenstein.) — nutans. (Opiz.) — striatum. (Bauer.) — *Hyssopus* Föniculum Sgl. (Günther.) — officinalis. L. (Hentschel.) — *Hysterium* conigenum. (Opiz.) — conigenum rimosum. (Jungbauer.) — quercinum. (Opiz.) — arundinaceum. (Opiz.) — Eryngii. Opiz. (Opiz.) — Rubi. P. (Reichenbach.) — Fraxini P. (Gerhard.) — pithyllum. Kunz. (Gerhard.) — *Jasione* pereunis. Lam. (Walter.) — montana. L. (Prochaska.) — *Jasminum* odoratissimum. L. (Speckmoser.) — *Iberis* amara. L. (Kostelecky.) — sempervirens. L. (Sehlmeyer.) — umbellata. L. (Hentschel.) — rotundifolia. L. (Bartenstein.) — *Illecebrum* verticillatum. L. (Streinz.) — *Impatiens* nolitangere. L. (Kostelecky.) — Balsamina. L. (Kostelecky.) — *Imperatoria* Chabraei. Sprengl. (Sehlmeyer.) — *Inula* brittanica. Lin. (Kostelecky.) — hirta. L. (Opiz.) — Pulicaria. L. (Moschuer.) — *Iris* Pseudacorus. L. (Opiz.) — variegata. L. (Hentschel.) — graminea. L. (Günther.) — *Isatis* tinctoria. L. (Formanek.) — *Isopyrum* thalictroides. L. (Kerndl.) — fumarioides. L. (Kostelecky.) — *Juglans* regia. L. (Mann.) — *Juncus* maximus. Rez. (Speckmoser.) — spicatus. L. (Braun.) — bulbosus. L. (Kerndl.) — Jacquini. L. (Bartenstein.) — subverticillatus. Wulf. (Burckhardt.) — Tenageja. L. Fil. (Schlechtendahl) — squarrosus. L. (Grabowsky.) — capitatus. W. (Burckhardt) — alpinus. Vill. (Weihe.) — aquaticus. Roth (Walter.) — pilosus. L. (Fürrrohr.) — niveus. L. (Reinegger.) — lamprocarpos Ehrh. (Sehlmeyer.) — bottnicus. Wohlenb. (Weihe.) — *Jüngermannia* Baueri. Mart. (Bartenstein.) — asplenoides major. (Berchtold.) — epiphylla. L. (Jungbauer.) — furcata. L. (Berchtold.) — platyphylla. L. (Opiz.) — Tomentella. Ehrh. (Sykora.) — trilobata. Weber. (Bauer.) — albicans. (Opiz.) — *Juniperus* communis. L. (Petters.) — Sabina. L. (Mann.) — *Justicia* furcata. Jacq. (Adamowsky.) — nasuta. L. (Adamowsky.) — *Kitaibelia* vitifolia. L. (Maly.) — *Knautia* orientalis. L. (Günther.) — *Kochia* sericea. Schrader. (Kostelecky.) — hyssopifolia. R. S. (Kostelecky.) —

17

scoparia. Schrad. (Kosteletzky.) — *Köllera cristata* contigua. P. (Gerhard.) — *Lachenalia tricolor*. Aiton. (Speckmoser.) — *Lactuca tingitana*. (Kosteletzky.) — *Lagurus ovatus*. L. (Kosteletzky.) — *Lactuca perennis*. L. (Kosteletzky.) — *saligna*. L. (Ziz.) — *scariola*. L. (Kosteletzky.) — *Lamium amplexicaule*. L. (Eisenstein.) — *maculatum* L. (Opiz.) — *purpureum*. L. (Opiz.) — *garganicum*. L. (Günther.) — *album*. L. (Eisenstein.) — *Westphalicum*. Weihe. (Weihe.) — *Lantana nivea*. Vent. (Adamowsky.) — *cammaria*. L. (Maly.) — *Lapsana communis crispa*. W. (Weihe.) — *communis*. L. (Bayer) — *Laserpitium latifolium*. L. (Hölzel.) — *Lathyrus pratensis*. L. (Eisenstein.) — *articulatus*. L. (Kosteletzky.) — *Cicera*. L. (Hentschel.) — *odoratus*. L. (Hentschel.) — *sativus*. L. (Kosteletzky.) — *spurius*. W. (Kosteletzky.) — *Lavandula spica*. L. (Chottek.) — *dentata*. L. (Speckmoser.) — *multifida*. L. (Hentschel.) — *abrotanoides*. Lam. (Walter.) — *Lavatera cretica*. L. (Kosteletzky.) — *trimestris*. L. (Kosteletzky.) — *thuringiaca*. L. (Kosteletzky.) — *Lecanora albella sordidescens*. (Opiz.) — *lentigera*. Ach. (Kosteletzky.) — *testacea*. (Kosteletzky.) — *miniata*. Ach. (Benesch.) — *murorum*. (J. U. C. Günther.) — *Lecidea olivacea*. Opiz. (Benesch.) ³⁾ — *parase-ma microcarpa*. (Hentschel.) — *punctata*. (Gansauge.) — *sulphurea*. Achar. (Benesch.) — *candida*. (Kosteletzky.) — *icmadophila*. (Mann) — *geographica*. (Benesch.) — *Leontodon arcuatus*. Tausch. (Mann.) ⁴⁾ — *Lemna trisulca*. L. (Opiz.) — *Leontodon lividus*. W. et K. (Sommerauer) — *Taraxacum*. L. (Horsky.) — *Leonurus cardiaca*. L. (Mann.) — *marrubiastrum*. L. (Opiz.) — *sibiricus*. L. (Maly.) — *Lepidium graminifolium*. L. (Ziz.) — *latifolium*. L. (Berchtold.) — *ruderale*. L. (Eisenstein.) — *sativum*. L. (Eisenstein.) — *Pollichii*.

³⁾ *Lecidea*, crusta granulata, crassa, olivacea, apotheciis sessilibus, haemisphaericis, atris, intus corneis albidis. Opiz. Auf Basaltfelsen an der Zentfelsenmauer bei Böhmischaida in Böhmen. Opiz.

⁴⁾ *Leontodon scapo unifloro*; foliis glabris, runcinato-partitis, partitionibus arcuato-recurvis, obtusiusculis, subdentatis, foliolis calicis exterioribus ovatis, laxis. Tausch. bot. Zeit. 1821. Pragae. (Tausch.)

18
Roth. (Kostelecky.) — alpinum. L. (Hinterhuber.) — lyratum. L. (Kostelecky.) — *Lepraria botryoides*. (Hentschel.) — *Leskea trichomanoides* (Sehlmeyer.) — attenuata. (Gerhard.) — polyantha. (Fürrrohr.) — *Libanotis athamantina*. (Fürrrohr.) — *Licea strobulina*. Alb. et S. (Opiz.) — *Ligustrum vulgare*. L. (Kostelecky.) — *Lilium Martagon*. L. (Moschner.) — *Limosella aquatica*. L. (Praesens.) — *Linaria latifolia*. Desf. (Mann.) — latifolia, foliis oppositis. (Mann.) — — alpina. (Sommerauer) — Elatine. (Berchtold.) — genistaefolia. (Carl.) — minor. (Mann.) — spuria. (Gerhard.) — vulgaris. (Kostelecky.) — repens. (Kostelecky.) — bipartita. Vent. (Kostelecky.) — littoralis. Bernh. (Kostelecky.) — *Lindernia pyxidaria*. L. (Fürrrohr.) — *Linum catharticum*. L. (Eisenstein.) — flavum. L. (Opiz.) — perenne. L. (Thon.) — tenuifolium. L. (Hentschel.) — usitatissimum. L. (Kostelecky.) — squammulosum. Rudolph. (Weihe.) — *Lithospermum purpureo-coeruleum*. L. (Kostelecky.) — arvense. L. (Kostelecky.) — *Littorella lacustris*. L. (Burckhardt.) — *Lobelia bicolor*. Sims. (Braun.) — pubescens. Ait. (Braun.) — *Lolium perenne tenue*. L. (Böhm) — speciosum. M. Biebst. (Weihe.) — temulentum muticum. (Weihe.) — complanatum Schrad. (Weihe.) — *Lonicera parviflora*. Lamark. (Maly.) — *Lolium arvense*. With. (Weihe.) — perenne. L. (Kostelecky.) — temulentum. L. (Kostelecky.) — *Lonicera caprifolium*. L. (Opiz) — Periclymenum. L. (Mann.) — Xylosteum. L. (Moschner.) — tatarica. L. (Kostelecky.) — *Lopezia mexicana*. L. (Hentschel.) — *Lotus ciliatus*. Fischer. (Walter.) — corniculatus tenuifolius Poll. (Gerhard.) — ornithopodioides. L. (Kostelecky.) — tetragonolobus. L. (Kostelecky.) — Jacobaeus. L. (Petters.) — siliquosus. L. (Opiz.) — glaucus. Aiton. (Weihe.) — corniculatus. L. (Benesch.) — uliginosus. Hoffm. (Burckhardt.) — *Lunaria canescens*. Willd. (Walter.) — rediviva. L. (Bauer.) — *Lupinaster pentaphyllum*. Mönch. (Günther.) — *Lupinus hirsutus roseus* (Kostelecky.) — albus. L. (Kostelecky.) — *Luzula pallescens*. Link. (Walter.) — albida. (Eisenstein.) — maxima. (Braun) — pilosa. (Chottek.) — erecta. (Moschner.) — albida cuprina. Roehl. (Mann.) — *Lychnis alpina*. L. (Sieber.) — flosculi. L. (Kostelecky.) — viscaria. L. (Eisenstein.) —

chalconica. L. (Kosteletzky.) — *dioica*. L. (Horsky.) — *Lycium* *barbarum*. L. (Kosteletzky.) — *Lycopersicum* Humboldtii. Dun. (Kosteletzky.) — *Lycopodium* *radicans*. (Berchtold.) — *clavatum*. L. (Prochaska. Benesch.) — *inundatum*. (Bauer.) — *selaginoides* (Streinz. Huzelmann.) — *complanatum*. (Weihe.) — *recurvum*. (Prochaska.) — *Lycopsis* *rosea*. Lehm. (Weihe.) — *pulla*. L. (Moschner. Berchtold.) — *Lycopus* *europaeus*. L. (Eisenstein.) — *exaltatus* L. (Maly.) — *Lysimachia* *nemorum*. L. (Eisenstein.) — *Nummularia*. L. (Kosteletzky.) — *punctata*. L. (Carl.) — *thyrsiflora*. L. (Hinterhuber.) — *vulgaris*. L. (Eisenstein.) — *ciliata*. L. (Petters.) *Lythrum* *hyssopifolium*. L. (Mann.) — *Salicaria*. L. (Kosteletzky.) — *virgatum*. L. (Carl.) — *Madia* *mellosa*. L. (Kosteletzky.) — *Malaxis* *paludosa*. (Ziz.) — *Malva* *sylvestris*. L. (Mann.) — *niceensis*. Allion (Moschner.) — *capensis*. L. (Streinz.) — *limensis*. L. (Kosteletzky.) — *mauritiana*. L. (Kosteletzky.) — *fragrans*. Jacq. (Hentschel.) — *crispa*. L. (Eisenstein.) — *rotundifolia*. L. (Mann.) — *balsamea*. L. (Walter.) — *Manulea* *oppositifolia*. L. (Huzelmann.) — *Marrubium* *vulgare*. L. (Kosteletzky.) — *eandidissimum*. L. (Grabowsky.) — *astracanicum*. Jacq. (Weihe.) — *Martinia* *proboscidea*. L. (Mann.) — *Matthiola* *tricuspidata*. (Kosteletzky.) — *Matricaria* *Chamomilla*. L. (Kosteletzky.) — *Medicago* *aculeata*. W. (Kosteletzky.) — *falcata*. L. (Moschner.) — *lupulina*. L. (Kosteletzky.) — *media* Pers. (Kosteletzky.) — *minima*. L. (Opiz.) — *orbicularis*. W. (Kosteletzky.) — *sativa*. L. (Kosteletzky.) — *sativa*. L. (Kosteletzky.) — *denticulata*. W. (Moschner.) — *Echinus*. De C. (Kosteletzky.) — *Murex*. Willd. (Kosteletzky.) — *scutellata*. Lam. (Mann.) — *Terebellum*. L. (Kosteletzky.) — *tornata*. L. (Kosteletzky.) — *procumbens*. Besser. (Kosteletzky.) — *granadensis*. W. (Kosteletzky.) — *Meesia* *uliginosa*. (Sykora.) — *minor*. (Bartenstein.) — *Melampodium* *longifolium*. Brous. (Moschner.) — *Melampyrum* *arvense*. L. (Chottek.) — *cristatum*. L. (Mann.) — *nemorosum*. L. (Kosteletzky.) — *Melica* *altissima*. (Mann.) — *coerulea*. L. (Jungbauer.) — *ciliata*. L. (Kosteletzky.) — *nutans* L. (Kosteletzky.) — *Melilotus* *coerulea*. (Hentschel.) — *Kochiana*. Heyne. (Gerhard.) — *macrorrhizon*. W. et K. (Walter.) — *vulgaris*. Heyne. (Schlechtendahl.) — *cretica*. L. (Walter.) — *italica*.

L. (Steudel.) — mauritanica. Schousb. (Kostelecky.) — *Melissa* foliosa. Opiz. (Hinterhuber.) ⁵⁾ — neglecta. Opiz. (Fürnrohr.) ⁶⁾ — Calamintha. L. ⁷⁾ —

Ich ersuche die Herrn Entdecker neuer Pflanzen, wenn sie dieselben an mich einsenden, diesen zugleich die Diagnose beizulegen, um diese in dem gegenwärtigen Verzeichniß bekannt machen zu können.

Prag, am 9. Juli 1825.

P. M. Opiz.

⁵⁾ *Calamentha* foliosa. Opiz. (Thymus.) caule adscendente, foliis ovalibus, obtusiusculis, serratis, villosis; floralibus ovato-lanceolatis, basi angustatis, integerrimis, pedunculo communi longioribus; pedunculis axillaribus trichotomo-paniculato-verticillatis, calicibus fructiferis tubuloso-campanulatis, villosis, dentibus subaequalibus, longioribus setaceis, villis calicinis prominentibus. Opiz. *Melissa* Calamintha Schrank. fl. salisb. Braune Salzbg. fl. (exclus. syn.) — Kapuzinerberg bei Salzburg. Prof. Hinterhuber.

⁶⁾ *Calamentha* neglecta. Opiz. (Thymus.) caule stricto, foliis ovalibus, obtusiusculis, serratis, villosis: floralibus orbiculatis, pedunculo communi brevioribus, pedunculis axillaribus, trichotomo-paniculato-verticillatis; calicibus cylindricis, villosis, dentibus subaequalibus, setaceis, villis calicinis prominentibus. *Melissa* Nepeta. Schrank. Bair flor. (exclus. syn.) In montosis Ratisbonae. (Fürnrohr.)

⁷⁾ *Calamentha* montana. Link. caule adscendente; foliis ovatis, obtusiusculis, serratis, villosis; floralibus ovato-lanceolatis, serratis, pedunculo communi longioribus; pedunculis axillaribus trichotomo-paniculato-verticillatis; calicibus fructiferis cylindricis, villosis, dentibus inaequalibus, setaceis, inferioribus longissimis, ciliatis, villis calicinis inclusis. Opiz. Kapuzinerberg bei Salzburg. Prof. Hinterhuber.